

SÉMINAIRE DE THÉORIE SPECTRALE ET GÉOMÉTRIE

HE OUYANG

On isospectral deformations on nilmanifolds

Séminaire de Théorie spectrale et géométrie, tome S9 (1991), p. 119-120

http://www.numdam.org/item?id=TSG_1991__S9__119_0

© Séminaire de Théorie spectrale et géométrie (Grenoble), 1991, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Séminaire de Théorie spectrale et géométrie » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/legal.php>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

**RENCONTRES DE THEORIE SPECTRALE ET GEOMETRIE
GRENOBLE 1991
(Aussois du 7 au 14 avril)**

On isospectral deformations on nilmanifolds

He OUYANG

**Department of Mathematics
Washington University
ST LOUIS MO 63130
U.S.A.**

Suppose G is a simply-connected nilpotent Lie-group and Γ a discrete cocompact subgroup in G .

Suppose g is a left-invariant metric on nilmanifold $M = \Gamma \backslash G$ and $\{\Phi_t\}_{t \in I}$ is a continuous family of almost inner automorphisms relative to Γ (see [G]).

Then Gordon and Wilson proved in [GW] that $\{g_t = \Phi_t^* g\}_{t \in I}$ is an isospectral deformation of metric g on $\Gamma \backslash G$. Conversely we proved following theorem : if G is a 2-step nilpotent Lie-group, $\Gamma < G$ a cocompact lattice and $\{g_t\}_{t \in I}$ is a continuous isospectral family of left-invariant metrics on $\Gamma \backslash G$, then there exists a continuous family of almost inner automorphisms $\{\Phi_t\}_{t \in I}$ of G relative to Γ such that $g_t = \Phi_t^* g_0$. When G is nonsingular, the theorem is proved firstly by H. Pesce. He also independently proved the general theorem by explicitly describing all the irreducible unitary representations appeared in the representation of G on $L^2(\Gamma \backslash G)$.

For arbitrary step nilpotent group case, the same question is still open.

References

- [G] GORDON C. — *The Laplacian spectra versus the length spectra of Riemannian manifolds*, Contemp Math., 51 (1986), 63–80.
- [GW] GORDON C., WILSON E. — *Isospectral deformations of compact solvmanifolds*, J. Differential Geom., 19 (1984), 241–256.
- [O] OUYANG H. — *On spectral rigidity of deformations modulo almost inner automorphisms on nilmanifolds*, Preprint, 1990.
- [P] PESCE H. — *Finitude spectrale des variétés de Heisenberg*, Prépublication de l'Institut Fourier n° 157, Grenoble, 1990.
- [P] PESCE H. — *Calcul du spectre d'une nilvariété de rang deux et applications*, Prépublication de l'Institut Fourier, Grenoble, 1991.